

Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais

Os exames laboratoriais são ferramentas essenciais para a avaliação da saúde, mas sua interpretação precisa ir além dos valores de referência estatísticos. A abordagem tradicional, ensinada na faculdade de medicina, muitas vezes não considera individualidades bioquímicas, polimorfismos genéticos e fatores funcionais. Este artigo propõe uma visão mais integrada, baseada na medicina funcional, para otimizar a interpretação dos exames.

1. A Diferença entre Interpretação Estatística e Clínica

Os valores de referência laboratoriais são baseados na curva de Gauss (distribuição normal), que representa apenas uma média populacional. No entanto, estar dentro dessa média não significa necessariamente estar saudável. A medicina funcional enfatiza a necessidade de analisar cada exame no contexto individual do paciente, buscando otimização da saúde em vez de apenas evitar doenças.

2. Exames Essenciais e sua Interpretação Funcional

2.1. Hemograma

O hemograma completo fornece informações valiosas, mas muitas vezes são subutilizadas. Além da contagem de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, a análise de indicadores como o RDW (índice de anisocitose) pode revelar sinais precoces de deficiência nutricional, inflamação e envelhecimento.

2.2. Glicemia e Insulina

A glicemia isolada não é um bom indicador de resistência insulínica. Um paciente pode ter glicemia normal, mas insulina elevada, o que já caracteriza resistência insulínica e risco para diabetes. A relação glicemia/insulina (índice HOMA-IR) é um parâmetro mais confiável. O ideal é que a insulina esteja entre 2 e 5 $\mu\text{U/mL}$, sendo que valores acima de 8 já indicam problemas metabólicos.

2.3. Perfil Lipídico (Lipidograma)

O colesterol total isolado tem pouca relevância clínica. A relação triglicerídeos/HDL é um marcador mais preciso para avaliar riscos cardiovasculares:

- Triglicerídeos/HDL abaixo de 2,5 → LDL de partículas grandes e menos aterogênicas.
- Triglicerídeos elevados e HDL baixo → Indica LDL de partículas pequenas e densas, associado a maior risco cardiovascular.

2.4. Função Renal e Hepática

- Ureia e creatinina: Avaliam a função renal, mas devem ser analisadas em conjunto com a taxa de filtração glomerular.

- Transaminases (AST, ALT, Gama GT): Indicadores de saúde hepática e oxidação. Gama GT acima de 16 pode estar associada à resistência insulínica.

2.5. Hormônios

- Tireoide: O TSH isolado não é suficiente para diagnóstico de hipotireoidismo. A análise funcional deve incluir T3 livre, T4 livre e rT3.
- Hormônios sexuais: Estradiol, testosterona, SHBG e progesterona devem ser analisados em conjunto para um diagnóstico mais preciso.

2.6. Inflamação e Doenças Crônicas

- Proteína C Reativa Ultra Sensível (PCR-us): Indicador de inflamação crônica. O ideal é estar abaixo de 0,5 mg/L.
- Homocisteína: Níveis acima de 9 $\mu\text{mol/L}$ estão associados a maior risco cardiovascular, alterações neurológicas e câncer.

2.7. Vitaminas e Minerais

- Vitamina D (25(OH)D3): O nível ideal está entre 40 e 60 ng/mL. A dose de suplementação deve ser individualizada para atingir esse nível.
- Ferritina: Indicador de reservas de ferro. Para ativação do hormônio tireoidiano (T3), a ferritina deve estar acima de 70 ng/mL.

3. O Papel da Medicina Funcional

A medicina funcional busca identificar e corrigir desequilíbrios antes que se tornem doenças graves. Isso envolve três aspectos principais:

1. Antecedentes: Genética e predisposição.
2. Gatilhos: Fatores que desencadeiam a doença, como estresse, toxinas ou deficiências nutricionais.
3. Mediadores: Elementos que mantêm a condição ativa, como inflamação, resistência insulínica e estresse oxidativo.

Ao analisar os exames laboratoriais sob essa perspectiva, é possível intervir precocemente, promovendo longevidade e qualidade de vida.

Conclusão

A interpretação clínica dos exames laboratoriais deve ir além dos valores de referência tradicionais. A abordagem funcional permite identificar tendências e corrigir desequilíbrios antes que se transformem em doenças. Esse olhar mais detalhado e individualizado é fundamental para uma medicina mais preventiva e eficaz. Atenciosamente: Dr José Raimundo dos Santos.